Analysis

Centro Medico Polispecialistico
Laboratori Analisi

ISTRUZIONI E NORME DI PREPARAZIONE ALL'ESAME ENDOSCOPICO COLONSCOPIA:

Operatori: Dott. Benedetto FONTANA – Anestesista: Dott. Silvio FONTANA – Dott. Antonino Rubera

Il giorno prima dell'esame è consentita una colazione leggera (Es: camomilla o the' con un paio di fette biscottate), un pranzo leggero (Es: brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso). La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina). Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l'assunzione di PLENVU e fino all'esecuzione della colonscopia. In caso di stitichezza (feci dure con frequenza inferiore a tre volte la settimana) chiedere consiglio al medico per valutare l'aggiunta di un lassativo nei 2/3 giorni precedenti l'inizio della preparazione. Non assumere altri medicinali per via orale da almeno un'ora prima di assumere PLENVU ad almeno un'ora dopo in quanto possono essere eliminati attraverso l'apparato digestivo e non agire come dovrebbero.

Come preparare Plenvu Dose 1

1. Aprire la scatola ed estrarre la bustina Dose 1.
2. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente graduato che possa contenere 500 ml di liquido.
3. Aggiungere acqua fino a raggiungere 500 ml e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Questa operazione può richiedere fino a circa 8 minuti.

Come bere la Dose 1 di Plenvu

- Bere la soluzione da 500 ml della Dose 1 di Plenvu nell'arco di 30 minuti. Cercare di bere un bicchiere pieno ogni 10 – 15 minuti.
- Bere altri 500 ml di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Acqua, brodo, sciroppi diluiti/succo di frutta chiaro (senza polpa), tisane, tè nero o caffè (senza latte) sono tutte bevande idonee.

Come preparare la Dose 2 di Plenvu

1. Quando è pronto a prendere la Dose 2, versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B della Dose 2 in un recipiente graduato che possa contenere 500 ml di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere 500 ml e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Questa operazione può richiedere fino a circa 8 minuti

Come bere la Dose 2 di Plenvu

- In base ai tempi prescritti dallo schema di dosaggio raccomandato, preparare e bere la soluzione da 500 ml della Dose 2 di Plenvu nell'arco di 30 minuti.
- Bere altri 500 ml di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti.

Si possono bere altri liquidi chiari prima, durante e dopo l'assunzione di Plenvu.

INDICAZIONI GENERALI

- Portare i referti endoscopici o radiologici precedenti e l'elenco dei medicinali che si stanno assumendo;
- IL PAZIENTE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO E DOPO L'ESAME NON PUÒ GUIDARE ALCUN VEICOLO;
- IL GIORNO DELL'ESAME PRESENTARSI A DIGIUNO, SENZA BERE NÉ MANGIARE.
- PRESENTARSI VESTITI COMODI (NO PANCIERE, CALZE, ETCC…)

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Il giorno prima dell'esame: SI DEVE ASSUMERE TUTTO IL PRODOTTO (PLENVU®+ LIQUIDI CHIARI) PER POTER ESEGUIRE UN ESAME CORRETTO.

- Ore 16,30: assumere la prima dose di soluzione
- Ore 20,30: assumere la seconda dose di soluzione

PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL CENTRALINO ALLO 0773/720175

MEDICINALI DA SPOSPENDERE

SE SI STANNO ASSUMENDO FARMACI CHIEDERE CONSIGLI AL PROPRIO MEDICO PER VALUTARE LA CONTINUAZIONE O MODIFICHE DELL'ASSUNZIONE (Es.: FARMACI ANTICOAGULANTI COME SINTROM E COUMADIN – vedi tabella specifica

FARMACO	SOSPENSIONE	
COUMADIN (WARFARIN)	INR <1,4	VIT K
PRADAXA (DABIGRATAN)	48 H	INIBITORE PRADAXA
PLAVIX (CLOPIDROGEL)	10 GIORNI	
EFFIENT (PRASUGREL)	7-10 GIORNI	
TIKLID (TICLOPIDINA)	10-14 GIORNI	
XARELTO (RIVAROXABAN)	24 H	
ELIQUIS (APIXABAN)	48 H	
REOPRO (ABICIXIMAB)	48 H	
BRILIQUE (TICAGRELOR)	5-7 GIORNI	
ARIXTRA	36-42 H	
EPARINA ENDOVENOSA	4 H	
ENOXAPARINA	12 H	
LIXIANA	48 H	
PLACTIDIL(PICOTAMIDE)	7-10 GIORNI	
CARDIOASPIRINA	3-4 GIORNI	

N.B.:

IL COSTO DELL'ESAME ISTOLOGICO RESTERA' INVARIATO NEL CASO IN CUI IL PRELIEVO VERRA' EFFETTUATO IN UNA SOLA ZONA (50,00 €).

OGNI PROVETTA AGGIUNTIVA, IN CASO DI PRELIEVI MULTIPLI (ES. STUDIO DEI VILLI, ANTRO E CORPO FONDO) AVRA' UN COSTO DI 20,00 €.

A tal proposito è importante evidenziare che i prelievi multipli consentono di continuare ad offrire la possibilità di effettuare un esame accurato e una diagnosi completa, dove serve, ricca di particolari, ma allo stesso tempo, risultano essere molto costosi.